



T.C.  
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI  
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

441 sayılı KHK, 20/08/2001 tarihli ve 2001/2960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara istinaden yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

<b>Firmanın</b>	
Adı	AGROMİN KİMYA VE TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	464
<b>Kimyevi Gübrenin</b>	
Tip İsmi	Bor(B),Bakır(Cu), Demir(Fe),Mangan (Mn), Molibden (Mo) veÇinko (Zn) Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Düzenlenirken esas alınan kriter	EC FERTILIZER
Verilen Bakanlık Tescil No	11706
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Agromin Black Mix
<b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>	
Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı	AGROMİN KİMYA VE TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre tip ismi	Bor(B),Bakır(Cu), Demir(Fe),Mangan (Mn), Molibden (Mo) veÇinko (Zn) Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
İz elementler kütlece %	Suda Çözünür; B:0.2,Cu:0.3,Fe:2,Mn:0.8,Mo:0.03,Zn:2.0
İz elementlerin şelatlama maddesinin adı ve miktarı	EDTA İle Şelatlı Fe:0.4,Mn:0.1,Zn:0.4
Üretildiği Ülke	Türkiye
Net ağırlığı	0.4-0.5-1-5-25 Kg
Depolama sıcaklığı	+4/+45°C
Diğer işaretler	EC FERTILIZER ibaresi,çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, kullanım dozu ve miktarı, uyarılar, lisans ve tescil no, ürt.tarihi, son kullanma tarihi, şarj no, firma adresi

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih : 31/12/2008

  
Mustafa ERDOĞAN  
Genel Müdür Yardımcısı

## EC FERTILIZER

Bor(B),Bakır(Cu),Demir(Fe),Mangan(Mn),Molibden(Mo) ve Çinko(Zn) Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

## Agromin Black Mix

Garanti Edilmiş İçeriği	(% w/w)
Suda çözünür Bor(B)	: 0,2
Suda çözünür Bakır(Cu)	: 0,3
Suda çözünür Demir(Fe)	: 2
EDTA ile şelatlı Demir (Fe)	: 0,4
Suda çözünür Mangan(Mn)	: 0,8
EDTA şelatlı Mangan(Mn)	: 0,1
Suda çözünür Molibden(Mo)	: 0,03
Suda çözünür Çinko(Zn)	: 2,0
EDTA ile şelatlı Çinko(Zn)	: 0,4

Stabil pH aralıkları:

Demir(Fe): (4-8), Mangan(Mn) : (5-8), Çinko(Zn) : (5-8)

ÖN KARIŞIM: Agromin **Black Mix** ayrı bir kaptaki suda eritilir ve iyice karıştırıldıktan sonra ana tanka ilave edilir.

## UYARILAR

- Sadece gerekli olan yerlerde kullanılır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız
- Sigara içmeyiniz
- Gözlük ve eldiven kullanınız
- Yutulması veya uzun süre teneffüs edilmesi durumunda medikal tedbirler alınır
- Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz
- Herhangi bir şey yiyip, içmeyiniz
- Teneffüs etmeyiniz, yutmayınız
- Göze ve deriye bulaşırsa bol su ile yıkayınız.

Üretim Tarihi : Son kullanma tarihi : Parti No : Lisans No : Tescil No: Net Ağırlığı.

+4°, +45°C arasında normal depolama yapılır. İmal tarihinden itibaren 3 yıl özelliklerini korur.

## BİTKİ ADI

## KULANIM ZAMANI

## DOZAJ(100 lt suya)

BİTKİ ADI	KULANIM ZAMANI	DOZAJ(100 lt suya)
Mandalina, Portakal, Limon, Greyfurt	Çiçeklemeden döneminde 1.uygulama; meyve tutumunda 2.uygulama; hasattan 45 gün önce 3.uygulama yapılır Damlama sulama yöntemi ile	100-200 gr 1kg/dekar
Elma, Kiraz, Ayva, Armut, Erik, Vişne, Şeftali, Kayısı, Fındık, Ceviz, Nar, Zeytin	Pembe tomurcuk döneminde veya çiçekler %5-10 açığında 1.uygulama; meyve tutumunda 2.uygulama; hasattan önce 3.uygulama yapılır Damlama sulama yöntemi ile	100-200 gr 1kg/dekar
Üzüm	Çiçekten önce 1.uygulama; çiçekten sonra 2.uygulama; Erken sonbaharda 3.uygulama yapılır	100-200 gr
Pamuk	Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk.uygulama; tarak oluşumunda 2.uygulama; ilk kozalar oluşmaya başlayınca 3.uygulama yapılır.	100-200 gr
Tütün	Bitki yastıkta iken ilk uygulama; tarlaya şaşırtma yapıldıktan sonra 2.uygulama; 15 gün sonra 3.uygulama yapılır.	100-200 gr
Mısır, Ayçiçeği	Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk uygulama; 15 gün sonra 2.uygulama yapılır	100-200 gr
Buğday, Arpa, Çeltik, Çavdar	Kardeşleme döneminde yabancı ot ilaçları ile birlikte tek uygulama yapılır	100-200 gr
Çilek	Çiçek döneminde 1.uygulama ve 15 gün aralıklarla 2.uygulama yapılır	100-200 gr
Domates, Hıyar, Biber, Dolma Biber, Patlıcan, Kabak ve Diğer Sebzeler	Fideler yastıkta iken bir teneke suya 50 cc ilave edilir ve uygulanır. Çiçeklenmeden önce 1.uygulama ve hasat sonuna kadar 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir Damlama sulama yöntemi ile	100-200 gr 1kg/dekar
Nohut, Mercimek, Bezelye, Bakla ve Fasulye, Bamya	Yapraklar oluşuktan sonra 15 gün sonra 2.uygulama yapılır	100-200 gr
Şekerpancarı, Patates ve Soğan, Sarımsak, Turp, Havuç	Birinci çapada ilk uygulama ve 15 gün sonra 2.uygulama yapılır	100-200 gr
Marul, Kıvırcık, Ispanak, Lahana, Karnabahar, Pırasa, Enginar, Kereviz	Yapraklar oluşmaya başlayınca 1.uygulama ve 15 gün sonra 2.uygulama yapılır	100-200 gr
Kavun, Karpuz	Çiçeklenme öncesinde 1.uygulama; 10-15 gün sonra 2.uygulama yapılır	100-200 gr

İş bu etiket örneği piyasaya sunacağımız etiketin aynısıdır. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemlerin tümünü peşinen kabul ederim.



AGROMİN KİMYA VE TARIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
 Vedik Organize San. Çığdaş Emek Sit.100 Yıl Bulv.21 Cd.647 Sk.No.222  
 Tel & Fax: 0312.3941944 Vedik / ANKARA  
 Üretim Yeri: Alanya Karayolu 25. Km. Yukarı Kocayatak Girişi  
 Tel: 0242.7297616 Fax: 0242.7297132 SERİK / ANTALYA  
 Östüm V.D. 524 000 74 01